

## Uwagi

1. Badanie tomografii komputerowej przeciwwskazane jest w ciąży (poza wskazaniami życiowymi, o których decyduje lekarz).
2. Niewydolność nerek i choroby tarczycy mogą stanowić przeciwwskazania do dożylnego podania środka kontrastowego. Jeżeli występują one u chorego, prosimy o określenie przez lekarza kierującego, czy można pacjentowi podać dożylnie jodowy środek kontrastowy.
3. Pacjent musi być na czczo - 4÷5 godzin przed badaniem (bez jedzenia; pacjent może pić wodę niegazowaną).
4. W przypadku badań jamy brzusznej i miednicy mniejszej pacjent otrzymuje doustnie 100÷200 ml roztworu środka kontrastowego + kontrast dożylny.
5. Nie należy wykonywać badania TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej w ciągu 5÷7 dni od badań RTG z podaniem barytu (artefakty w badaniu TK).
6. Czas badania TK wynosi 5÷20 min i wymagane jest bezwzględne leżenie bez ruchu przez pacjenta. Jeżeli chory jest pobudzony lub cierpi na silny zespół bólowy uniemożliwiający leżenie, konieczne jest wcześniejsze ustalenie z pracownią TK sedacji pacjenta przez lekarza anestezjologa.
7. Zakład zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie dotyczące wyników badań. Ich publikacja wymaga zgody Kierownika Zakładu.

Dojazd do NZOZ AVI Diagnostyka Obrazowa  
00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 1

### AUTOBUSY

119, 107, 141, 159, 162, 131, 143, 185, 187, 416, 522

